



Amphith atre du Plat d'Etain
Mardi 28 f vrier 2017   18h00

Les Troubles bipolaires

Pr sent e par

Mathieu Lemaire

Pr sentation du conf rencier

Le Dr Mathieu Lemaire est m decin psychiatre, praticien hospitalier   la clinique psychiatrique universitaire au CHRU de Tours (Pr Camus, chef de service).

Il a effectu  son internat dans les diff rents services de la r gion centre. Il a ensuite  t  Assistant Hospitalo-Universitaire en physiologie dans le Centre Universitaire de P dopsychiatrie du CHRU de Tours (Pr Bonnet-Brilhault, chef de service), service sp cialit  dans les troubles du d veloppement et en particulier l'autisme de l'enfance   l' ge adulte.

Il s'int resse tr s t t lors de sa formation aux troubles bipolaires et plus particuli rement   la r activit   motionnelle lors des phases de stabilit  de la maladie.

Il r alise actuellement un travail de recherche, dans le cadre d'une th se de sciences sur les particularit s, de la r ponse  motionnelle chez les patients avec un trouble bipolaire ou avec un autisme sans d ficiance intellectuelle.

Pr sentation de la conf rence.

Il existe diff rents types de troubles mentaux, qui se caract risent g n ralement par un ensemble de sympt mes qui affectent les pens es, les perceptions, les  motions, les comportements et les relations avec autrui.

Parmi les troubles mentaux figurent : la d pression, les troubles bipolaires, les troubles anxieux, la schizophr nie, les d mences, la d ficiance intellectuelle et les troubles du d veloppement (dont l'autisme)...

Le trouble bipolaire concerne plus de 1 % de la population mondiale et sa fr quence ne d pend ni du pays, ni des origines ethnique et ni du contexte socio conomique.

Le trouble bipolaire est une pathologie chronique d butant souvent chez l'adulte jeune. Le handicap associ    ce trouble est tr s important avec une surmortalit  en particulier li  au suicide.

Il s'agit d'un trouble r current de l'humeur alternant des phases d'expansion de l'humeur avec une augmentation de l' nergie et des activit s (manie ou hypomanie), et des baisses de l'humeur (d pression), avec des intervalles libres plus ou moins longs. Le trouble bipolaire est l'une des pathologies psychiatriques les plus s v res avec de nombreuses comorbidit s physiques et psychiatriques. Le diagnostic de ce trouble est complexe et on estime que le d lai entre le d but de la maladie et le diagnostic est en moyenne de 5   10 ans